

TERMÉKISMERTETŐ

Egyben címke: Az 1-es számú flakont (80 ml oldattal) és a 2-es számú flakont (20 ml oldattal) tartalmazó kartondoboznak.

NOSESTAT® oldat

Állatgyógyászati gyógyhatású készítmény méhek kezelésére.

A készítmény összetétele:

- Az 1-es számú flakon tartalma:
jód (4 g) vivő- és segédanyagok (ad 80 ml).
- A 2-es számú flakon tartalma:
hangyasav (5 g) vivő- és segédanyagok (ad 20 ml).

Célállatfaj:

mézelő méh (*Apis mellifera* L.)

A készítmény felhasználási területének rövid leírása, felhasználási javaslat, javallatok:

A NOSESTAT® oldat a *Nosema apis* és *Nosema ceranae* által okozott nosemosis kiegészítő kezelésére ajánlott. Hatását a benne található jód és hangyasav kedvező tulajdonságának köszönheti. A termék hangyasavtartalma segít a varroa atkák (*Varroa destructor*) által okozott varroatozis kiegészítő kezelésében is. A termék stabilizáló és ízesítő anyagokat is tartalmaz, így a méhek szívesen fogyasztják. A NOSESTAT® oldat felhasználható cukorlepénnyel vagy cukorsziruppal feletetve, melyben jól oldódik.

Ajánlott kezelési időszak: ősszel és tavasszal.

Az adagolás és az alkalmazás módja:

Belsőleg, 1:1 arányú (50%-os) cukorsziruppal vagy cukorlepénnyel feletetve.

A flakonok tartalmát jól fel kell rázni, majd a 2-es számú flakon tartalmát az 1-es számú flakonba kell önteni. Az így kapott oldatot össze kell keverni.

1 liter cukorsziruphoz vagy 1 kg cukorlepényhez a fenti keverékből 5 ml-t adjunk.

Az elkészített és cukorlepénybe vagy cukorszirupba kevert oldat 3 napig használható fel.

Cukorsziruppal történő kezelés:

A sziruppal három alkalommal kell kezelni a méheket, az egyes kezelések között három nap szünetet tartva (azaz az 1., a 4. és a 7. napon). Kezelésenként 500-800 ml-t kell feletetni. Egy hét szünet után meg kell ismételni a kezelést az előbbieik szerint.

Cukorlepénnyel történő kezelés:

A cukorlepénnyel történő kezelésnél 200-300 g-ot adjunk a méhcsaládnak. Miután a méhek elfogyasztották a NOSESTAT® oldatos cukorlepényt, még egy alkalommal ismételjük meg a kezelést.

A készítmény keveréktakarmány előállítására nem használható fel!

A túlادagolás elkerülése érdekében a NOSESTAT® oldat cukorsziruphoz vagy cukorlepényhez történő adagolásához használja a mellékelt fecskendőt.

Ellenjavallatok:

Ne alkalmazzuk együtt más kezelésre vagy megelőzésre szolgáló készítményekkel.

A NOSESTAT® oldat használatát legkésőbb a mézhordás megkezdését megelőző 7. napon be kell fejezni.

Mellékhatások:

Mellékhatásokat nem figyeltek meg.



Figyelmeztetések:

A NOSESTAT® oldattal végzett munka során ajánlott polietilén vagy latex védőkesztyű, valamint védőoverall használata, megelőzendő a bőr irritációját és elszíneződését, valamint a ruházat elszíneződését.


A NOSESTAT® oldat használata nem helyettesíti a varroatozis elleni célzott kezelést.

Veszélyesanyag-tartalom az 1-es flakonban: jó

GHS07



GHS09

**FIGYELEM**

A veszélyes keverékek veszélyeire/kockázataira utaló **H-mondatok:**


- Bőrrel érintkezve ártalmas.
- Belélegezve ártalmas.
- Nagyon mérgező a vízi élővilágra.

A veszélyes keverékek biztonságos használatára utaló **P-mondatok:**

- Kizárólag szabadban vagy jól szellőző helyiségben használható.
- Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való kijutását.
- Rosszullét esetén forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz.
- HA BŐRRE KERÜL: Lemosás bő szappanos vízzel.
- BELÉLEGZÉS ESETÉN: Az érintett személyt friss levegőre kell vinni és olyan nyugalmi testhelyzetbe kell helyezni, hogy könnyen tudjon lélegezni.
- A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: a helyi rendelkezéseknek megfelelően.

Veszélyesanyag-tartalom a 2-es flakonban: hangyasav

GHS05

**VESZÉLY**

A veszélyes keverékek veszélyeire/kockázataira utaló **H-mondatok:**

- Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz.

A veszélyes keverékek biztonságos használatára utaló **P-mondatok:**

- Gyermekektől elzárva tartandó.
- BELÉLEGZÉS ESETÉN: Az érintett személyt friss levegőre kell vinni és olyan nyugalmi testhelyzetbe kell helyezni, hogy könnyen tudjon lélegezni.
- SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.

- LENYELÉS ESETÉN: a szájat ki kell öblíteni. TILOS hánytatni.
- HA BŐRRE (vagy hajra) KERÜL: Az összes szennyezett ruhadarabot azonnal el kell távolítani/le kell vetni. A bőrt le kell öblíteni vízzel/zuhanyozás.
- A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: a helyi rendelkezéseknek megfelelően.

Lejáratí idő:

Felhasználható eredeti csomagolásban tárolva a gyártástól számított 2 évig.
Az előírt feloldás utáni lejáratí idő 20 nap.

Tárolási előírások:

A készítmény eredeti csomagolásban, száraz, jól szellőző helyen, közvetlen napfénytől védve, 5–30 °C között tárolandó.

Csomagolás:

A kartondoboz tartalma:

Az 1. számú tartály: 80 ml oldatot tartalmazó üveg, vagy PE flakon.

A 2. számú tartály: 20 ml oldatot tartalmazó PE flakon.

Egyszer használatos fecskendő, hosszabbítóval mellékelve.

Kizárólag állategészségügyi célra!

A fel nem használt anyag és a hulladék kezelésének módja:

A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: a helyi rendelkezéseknek megfelelően.

Gyártó:

Primavet-Sofia Ltd, 211A, Slivnitsa blvd. 1202 Szófia, Bulgária

Forgalmazó:

EURO-VET Zöldsziget Kft. 7500 Nagyatád, Petőfi Sándor u. 24. Tel.: 06-82/454-413;

Fax: 06-82/553-180; zoldsziget.euro-vet.hu; zoldsziget@euro-vet.hu

A készítmény nyilvántartási száma:

472/1/2012 NÉBIH ÁTI

Lejáratí idő:

Gyártási szám:

