

## HASZNÁLATI UTASÍTÁS

Egyben címke 100 db. Illetve 4x100 db zacskót tartalmazó kartondobozra

Api Life Var impregnált csík mézelő méheknek A.U.V.

### 1. A FORGALOMBA HOZATALI ENGEDÉLY JOGOSULTJÁNAK, TOVÁBBÁ AMENNYIBEN ETTŐL ELTÉR, A GYÁRTÁSI TÉTELEK FELSZABADÍTÁSÁÉRT FELELŐS GYÁRTÓ NEVE ÉS CÍME

Engedélyes: Chemicals Laif S.P.A., Viale dell'Artigianato 13, 35010 Vigonza (PD), Olaszország

Gyártó: Chemicals Laif S.P.A. Via Roma 69, 36020 Castegnero (VI), Olaszország

### 2. AZ ÁLLATGYÓGYÁSZATI KÉSZÍTMÉNY NEVE

### 3. HATÓANYAGOK ÉS EGYÉB ÖSSZETEVŐK MEGNEVEZÉSE

1 db csík (11 g) tartalmaz:

**Hatóanyagok:**

timol: 8 g

eukaliptusz olaj: 1,72 g

(1-8 cineole>1,2 g)

kámfor: 0,39 g

L-mentol: 0,39 g

**Segédanyag:**

fenoplaszt

### 4. JAVALLATOK

A készítmény mézelő méhek varroatozisének (*Varroa destructor* által okozott parazitózisának) kezelésére alkalmas.

### 5. ELLENJAVALLATOK

Nem alkalmazható mézhordás idején.

Nem alkalmazható abban az esetben, ha a nappali csúcshőmérséklet meghaladja a 30°C-t.

### 6. MELLÉKHATÁSOK

Az alkalmazást követő néhány napon át a méhcsaládoknál esetleg enyhe izgalom, ingerültség jelentkezhet.

30°C-t meghaladó hőmérséklet esetén alkalmazva izgatottság jelentkezhet, illetve növekedhet a fiasítás és a kifejlett méhek elhullásának aránya.

Ha súlyos nemkívánatos hatást vagy egyéb, a használati utasításban nem szereplő hatásokat észlel, értesítse erről a kezelő állatorvost!

### 7. CÉLÁLLAT FAJOK

Mézelő méh (*Apis mellifera* L.)

### 8. ADAGOLÁS, ALKALMAZÁSI MÓD(OK) CÉLÁLLAT FAJONKÉNT

Méhkaptárban való alkalmazásra.


Gyógyszeradagolás: Egy zacskó 2 db csíkot tartalmaz, egy csík egy család egyszeri kezelésére alkalmas.

A kezelés 7 – 10 naponta ismételhető, a fertőzöttség függvényében, legfeljebb 4 alkalommal. A kezelés végén, amennyiben maradt csík vagy annak darabja a kaptárban, akkor azt el kell távolítani.


Alkalmazási mód:

A zacskóból kivett csíkot törjük négy részbe, nyissuk ki a kaptárt és helyezzük be az egyes darabokat a léputcák fölé, a sarkokba, távol a kaptár középső részén lévő fiasítástól. Zárjuk vissza a kaptárt. A termék mintegy 7-10 napon keresztül kifejti hatását. (lásd az 1,2,3,4 sz. ábrát). A kezelés a fertőzöttség függvényében legfeljebb 4 alkalommal ismételhető.







1.



2.



3.



4.

5. Nyissuk ki a 2 db csikot tartalmazó csomagot.
6. Vegyük ki az egyik csikot, s törjük 3-4 felé.
7. Nyissuk ki a kaptárt, s helyezzük az egyes darabokat a képen látható módon a léputcák fölé!
8. Zárjuk vissza a kaptárt. A kezelés 7-10 naponta ismételhető, a fertőzöttség függvényében, legfeljebb 4 alkalommal. Az esetleges maradványanyagokat a kezelés végén távolítsuk el!



A kezeléseket mézpergetés után, illetve a fiókok elvételét követően végezzük!

## 9. A HELYES ALKALMAZÁSRA VONATKOZÓ JAVASLAT

A készítmény hatékonysága méhcsaládonként a környezeti tényezők hatására (hőmérséklet, újrafertőződés) változó lehet. Az Api Life Var készítményt a varroa atka elleni integrált védekezés részeként ajánlott alkalmazni, a lehullott atkák számának folyamatos ellenőrzésével. Amennyiben az atkafertőzöttség növekedése tapasztalható, ajánlott egyéb kiegészítő kezelést alkalmazni a téli-tavaszi varroa atka elleni kezeléskor.

## 10. ÉLELMEZÉS-EGÉSZSÉGÜGYI VÁRAKOZÁSI IDŐ

Méz: nulla nap.

Mézhordás ideje alatt nem alkalmazható.

## 11. KÜLÖNLEGES TÁROLÁSI ELŐÍRÁSOK

A kereskedelmi csomagolású állatgyógyászati készítmény felhasználható: 2 évig.

Felbontás után azonnal felhasználandó!

15-25°C között, az eredeti csomagolásban, közvetlen napfénytől védve tárolandó.

Fagyástól óvni kell.

Az esetleges szennyeződés elkerülése végett a készítmény növényvédő szerektől és egyéb vegyi anyagoktól távol tartandó.

Élelmiszerektől távol tartandó.

**Gyermekek elől gondosan el kell zárni!**

## **12. KÜLÖNLEGES FIGYELMEZTETÉSEK**

**Különleges figyelmeztetések minden célállat fajra vonatkozóan**

30°C-t meghaladó hőmérséklet esetén alkalmazva izgatottság jelentkezhet, illetve növekedhet a fiasítás és a kifejlett méhek elhullásának aránya.

A készítmény hatékonysága növelhető, ha késő nyáron, a mézhordás után (a petezés intenzitásának csökkenésekor) alkalmazzuk.

A készítménnyel való, megfelelő hatékonyságú kezelés 20-25°C közötti külső hőmérsékleten érhető el. Amennyiben a külső hőmérséklet 15°C alá csökken, gyengülhet a készítmény hatékonysága.

### **A kezelt állatokra vonatkozó különleges óvintézkedések**

Mézigyűjtési időszakban ne alkalmazzuk a készítményt!

A készítmény alkalmazása előtt ne etessük a méhcsaládokat!

A rablás elkerülése érdekében egy méhészetben az összes kaptárt egyszerre kezeljük.

Ügyeljünk rá, hogy az impregnált csíkot ne a fiasítás közelébe, ne a kaptár középső részébe helyezzük.

Kezelés előtt a gyenge méhcsaládokat egyesíteni szükséges.

Méztéri fiókok nélkül végezzük a kezeléseket!

Soha se helyezzük a csíkokat cukorszirup etető közelébe, mivel csökkentheti a méhek étvágyát!

### **Az állatok kezelését végző személyre vonatkozó különleges óvintézkedések**

A timol bőr irritatív tulajdonsága miatt az állatgyógyászati készítmény alkalmazása során az alábbi egyéni védőfelszerelés viselése kötelező: védőruházat, védőszemüveg, védőkesztyű. A készítmény alkalmazása során kerülni kell annak bőrre vagy szembe kerülését. Ha a készítmény mégis bőrre kerül, az érintett területet azonnal mossuk le bő szappanos vízzel. Véletlen szembe kerülés esetén a szemet bő vízzel, azonnal ki kell mosni. Tartós irritáció esetén orvoshoz kell fordulni. Véletlen belélegzés vagy lenyelés esetén az orrot, a szájat és a torkot vízzel ki kell öblíteni. Ha a tünetek nem múlnak, orvoshoz kell fordulni. Alkalmazás után a készítménnyel érintkezésbe kerülő eszközöket meg kell tisztítani, valamint alaposan kezdet kell mosni. A készítmény használata közben enni, inni, dohányozni tilos.

### **Túladagolás**

Az előírt dózissnál nagyobb mennyiség alkalmazása esetén viselkedési zavarok (nyugtalanlás, kaptárelhagyás, megnövekedett mortalitás) jelentkezhet. Túladagolás esetén távolítsuk el a terméket a kaptárból.

## **13. A FEL NEM HASZNÁLT KÉSZÍTMÉNY VAGY HULLADÉKAINAK KEZELÉSÉRE, MEGSEMMISÍTÉSÉRE VONATKOZÓ UTASÍTÁSOK**

A fel nem használt állatgyógyászati készítményt, valamint a keletkező hulladékokat a helyi követelményeknek megfelelően kell megsemmisíteni.

## **14. HASZNÁLATI UTASÍTÁS UTOLSÓ JÓVÁHAGYÁSÁNAK IDŐPONTJA**

2013. január 8.

## **15. TOVÁBBI INFORMÁCIÓK**

### **Törzskönyvi szám:**

3218/1/12 NÉBIH ÁTI (11 g csík)

### **Kiszereles:**

2 db impregnált csíkot tartalmazó laminált zacskó.

100 zacskó kartondobozban. Bontható. Használati utasítások mellékelve.

4 x 100 zacskó kartondobozban. Bontható. Használati utasítások mellékelve.

Kizárólag állatgyógyászati alkalmazásra.

Vény nélkül, szabadon forgalmazható.

Gy.sz.: lsd a csomagolás hátoldalán

Lejáratí idő: lsd a csomagolás hátoldalán

